



Tafirof DUO

Paracetamol 500 mg - Ibuprofeno 200 mg
Comprimidos recubiertos

Venta Libre - Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

¿Qué contiene Tafirof DUO?

Cada comprimido recubierto contiene: Paracetamol 500 mg; Ibuprofeno 200 mg.
Excipientes: Aerosil, Cellactose 80, Croscarmelosa sódica, PVP K 30, Estearato de magnesio, L.A Azul Indigotina, Lay AQ, cs.
Este medicamento es Libre de Gluten.

¿Para qué se usa Tafirof DUO?

Acción: Se usa para el alivio temporal del dolor leve o moderado asociado a dolor de cabeza, espalda, dolores menstruales, dentales, dolores reumáticos y musculares.

¿Qué personas no pueden recibir Tafirof DUO?

NO USE este medicamento en caso de: alergia al ibuprofeno, paracetamol, aspirina u otros analgésicos/ antiinflamatorios; úlcera u otras enfermedades gastrointestinales; alteraciones de la coagulación, tratamiento anticoagulante o diurético intensivo.

No ingerir otros productos que contengan paracetamol mientras esté en tratamiento con Tafirof DUO.

- No utilizar en pacientes con insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal grave o insuficiencia cardíaca grave.
- No utilizar a partir de las 30 semanas de embarazo.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

- Si Ud. consume algún medicamento por enfermedad crónica, consulte a su médico antes de utilizar Tafirof DUO.
- Si Ud. consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica por día, consulte a su médico antes de utilizar Tafirof Duo.
- Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Este medicamento no debe utilizarse a partir de las 30 semanas de embarazo. Y entre la semana 20 y 30 de embarazo debe utilizarse solo si es absolutamente necesario, a la menor dosis efectiva y a

la duración más corta posible y realizado un estricto control médico, ya que puede producir riesgo de daño renal en el neonato con la consiguiente disminución de la producción de líquido amniótico.

Hable con su médico o farmacéutico si: Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones").

Infecciones: Tafirof DUO puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto, es posible que Tafirof DUO pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

- No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Tafirof DUO no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento? • Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como, por ejemplo: náuseas, vómitos, diarrea o constipación, dolor abdominal, mareos, erupción de la piel, disminución en el recuento de plaquetas en el análisis de sangre.

Las reacciones adversas tales como mareos, trastornos del sueño y fatiga visual son posibles después de la administración de Tafirof DUO. En caso de verse afectados por estos síntomas, los pacientes no deben conducir o manejar máquinas.

¿Cómo se usa este medicamento?

Adultos y adolescentes mayores de 15 años: 1 comprimido recubierto de Tafirof DUO cada 8 horas con agua.

Dosis máxima: 3 (tres) comprimidos recubiertos por día (repartido cada 8 horas).

Niños menores de 15 años o adultos mayores de 65 años: consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días sin consulta médica. Si los síntomas persisten o empeoran en 3 días, consulte a su médico.

Para minimizar los efectos secundarios se recomienda que los pacientes ingieran el producto durante o después de haber comido algo, con un vaso lleno de agua.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT:

