



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

¿Qué contiene Tafirol 500 mg Comprimidos? Cada comprimido de 500 mg contiene: Ingredientes activos: Paracetamol 500,00 mg. Ingredientes inactivos: C.S.P. Este medicamento es Libre de Glúten. Acción: Analgésico - Antifebril. ¿Para qué se usa Tafirol 500 mg Comprimidos? Tafirol está indicado para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, menstruales, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y reducir la fiebre.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR TAFIROL 500 MG COMPRIMIDOS?

- Alergia conocida al paracetamol.
 - No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos, antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas.
 - Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. Tafirol 500 mg Comprimidos no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales, o alcoholismo.
 - Enfermedad del riñón, corazón o pulmones.
 - Anemia (disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina)
 - Menores de 12 años.
- s". No tomar más cantidad de medicamento que la recomendada en el apartado (¿Cómo se usa este medicamento?). Si tiene antecedentes de enfermedad del tracto digestivo superior (boca, faringe, esófago y estómago), por la posibilidad de sangrado, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No ingiera otro medicamento que contenga paracetamol u otro analgésico. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.



Paracetamol **300 mg**
Diclofenac Sódico **25 mg**
Cápsulas blandas
Venta Libre - Industria Argentina



El paracetamol puede tener interacciones con algunos de los siguientes medicamentos: anticoagulantes orales; antiepilépticos (utilizados para el tratamiento de crisis epilépticas); diuréticos (utilizados para aumentar la eliminación de orina); isoniazida (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis); rifampicina (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis); medicamentos antiinfecciosos; no utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor). Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento? Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento como: erupciones cutáneas (hinchazón y enrojecimiento de la piel), alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico. Si algo de esto sucede suspenda la medicación y consulte a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento? Concentración de 500 mg (Tafirol). Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 gramos por día (8 comprimidos de 500 mg). Pacientes mayores a 65 años y niños menores de 12 años: consulte con su médico. No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre, o bien si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, suspenda la medicación y consulte a su médico. La ranuración del comprimido no es funcional a la posología recomendada, sin embargo es útil en casos de dificultad para la deglución.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Presentaciones Tafirol 500 mg: Envases conteniendo 30, 100, 400 comp. de 500 mg cada uno (último tiene uso como expendedor).

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: Noviembre 2019.

